

# Une forme albinos de *Pabstiella pelfifeloides* (Orchidaceae, Pleurothallidinae)<sup>a</sup>

Flavia Simões<sup>1,\*</sup> & Renato Ximenes Bolsanello<sup>2</sup>

**Mots-clés/Keywords/Palavras chave :** albinisme/ albinism/ albinismo, Brésil/ Brazil/ Brasil, forêt atlantique/ Atlantic forest/ Mata Atlântica, forêts humides/ rainforest/ florestas úmidas.

## Résumé

Une forme albinos de *Pabstiella pelfifeloides* (Barbosa Rodrigues) Luer, originaire du Minas Gerais (Brésil), est décrite et illustrée.

## Abstract

An albino form of *Pabstiella pelfifeloides* (Orchidaceae, Pleurothallidinae) – Albinism is rarely reported for *Pabstiella*. Such a form, from Minas Gerais (Brazil), is presently described and illustrated for *Pabstiella pelfifeloides* (Barbosa Rodrigues) Luer.

## Resumo

Uma forma albina de *Pabstiella pelfifeloides* (Orchidaceae, Pleurothallidinae) – Albinismo é raramente reportada para *Pabstiella*. A forma, originária de Minas Gerais (Brasil), é descrita e ilustrada para *Pabstiella pelfifeloides* (Barbosa Rodrigues) Luer.

## Introduction

Les formes albinos sont rares chez les *Pabstiella*, et chez les Pleurothallidinae d'une manière plus générale. La forme décrite ici provient des forêts du Minas Gerais (Brésil) et, hormis la couleur,

---

<sup>a</sup> : manuscrit reçu le 4 novembre 2013, accepté le 20 novembre 2013

article mis en ligne sur [www.richardiana.com](http://www.richardiana.com) le 25/11/2013 – pp. 88-90 - © Tropicalia  
ISSN 1626-3596 (imp.) - 2262-9017 (élect.)

correspond tout à fait à *Pabstiella pelfeloides* (Barbosa Rodrigues) Luer. Cette espèce est commune dans les forêts humides de la Mata Atlântica, principalement dans les états de BA, ES et RJ (Barros *et al.*, 2013). Le spécimen albinos poussait au sein d'une population de plusieurs plantes de la même espèce. Sa couleur est uniformément jaune pâle légèrement verdâtre. Nous proposons ci-après pour cette forme le nom *albina*.



**Fig. 1 :** *Pabstiella pelfeloides* f. *albina*  
en compagnie de la forme typique

*Pabstiella pellioides* (Barbosa Rodrigues) Luer f. *albina* F.Simões e Ximenes Bolsanello, *forma nova*

*Haec herba Pabstiella pellioides similis est sed floribus luteis pallidis differt.*

Type : Brésil, Minas Gerais, Itamarati de Minas, distrito de Serra dos Caramonos, 01/05/2011, F.Simões sn (holotype : MBML 47018).

Etymologie : *albina* fait référence au caractère albinos de ce taxon.

Les parties végétatives et florales de cette forme sont identiques à celles de la forme typique de *Pabstiella pellioides*. Seule la couleur des fleurs (jaune pâle légèrement verdâtre uniforme) la distingue (Fig. 1).

La forêt où a été trouvé le spécimen type est une forêt de montagne, située à une altitude de 1 200 m environ. Les coordonnées géographiques sont de 21,406° Sud, 42,809° Ouest. Le climat est caractérisé par des hivers secs et des étés pluvieux, une température moyenne annuelle de 21°C, avec des minima de 6°C et des maxima de 36°C.

## Références

Barros, F. de, F.Vinhos, V.T.Rodrigues, F.F.V.A.Barberena, C.N.Fraga, E.M.Pessoa, W.Forster & L.Menini Neto, 2013. Orchidaceae in *Lista de Espécies da Flora do Brasil*, Jardim Botânico do Rio de Janeiro, sur <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB11529>.

photographies : Flavia Simões

---

1 : Avenida João Inácio Peixoto, 636, Bairro Granjaria, Cataguases, MG 36.773-560 (Brésil)

\*auteur pour la correspondance : adelpha.simoese@gmail.com

2 : Rua Dom Jorge de Menezes 1084, Centro Vila Velha, ES – CEP 29100-250 (Brésil)